

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
ACT X Plus 10-0-5

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 10
Üre Azotu (N)	: % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI VE AMACI	UYGULAMA DOZU
BAĞ	Çiçek dökümünden 10-15 gün sonra tanelere uygulanır	Meyve ıslatma; 50 ml / 100 Lt su
ÇİLEK	Meyve olgunlaşma döneminde uygulanır.	Meyve ıslatma; 50 ml / 100 Lt su
KİVİ	*İlk sürgün gelişiminde, Çiçeklenmeden 1-2 hafta önce sürgünlere uygulanır. *Çiçek dökümünden 30 gün sonra meyvelere uygulanır;	50 ml / 100 Lt su 50 ml / 100 Lt su Meyve ıslatma
PORTAKAL	Çiçek dökümünden 3-7 gün sonra ve 25-35 gün sonra genç meyvelere uygulanır;	Sapların ıslatılması; 50-75 ml / 100 Lt su
ŞEFTALİ, ERİK, ZEYTİN v.b.	Çiçek dökümünden 20-30 gün sonra meyve ıslatma şeklinde uygulanır;	50-75 ml / 100 Lt su
ARMUT, AYVA, v.b.	Çiçeklenme döneminde yaprak uygulaması, meyve tutumunda meyve uygulaması.	50 ml / 100 Lt su
TÜM MEYVE FİDANLARINDA	Dikim öncesi ve sonrası 2 kez Yapraktan uygulama yapılır,	50 ml / 100 Lt su
TÜM MEYVE AĞAÇLARINDA	İlk gelişim döneminde 10 gün arayla 2 kez sürgünlere uygulama yapılır.	50 ml / 100 Lt su
KİRAZ	*Çiçek dökümü sonrası ilk meyve oluşumunda, *Meyvelerin sarı saman rengi döneminde	50 ml/100 Lt su
TROPİKAL BİTKİLER; MUZ, ANANAS v.b.	Çiçek dökümü sonrası ilk meyve tutumu döneminde meyve ıslatma	50 ml / 100 Lt su

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: TAKAVCI TARIM A.Ş.

ADRES: Bayaşaar Mah. 41952 Sokak Takavcı Meremer Sit. No: 1/3 Beyşehir/

KONYA TEL: 0332 514 81 10

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
TAKAVCI TARIM
ANONİM ŞİRKETİ
Bayaşaar Mah. 41952 Sok. Takavcı Meremer
No: 1/3 - Tel: 0332 514 8110 - Beyşehir/KONYA
BEYŞEHİR Y.D. 816 114 5306